

## Csípőízületi diszplázia bírálati lap

### A röntgenfelvétel

beküldő állatorvos: .....

**A medence** kontrasztos

kontrasztszegény

**A combok** szimmetrikus

aszimmetrikus

párhuzamosak

szét v. összetérnek

jól nyújtottak

kevésbé nyújtottak

/párhuzamosak a kazettával/  
jól beforgatottak

kevésbé beforgatott

túlzottan beforgatott

**Az ízületi vápa** bal jobb

mély

**Elülső vápaszél**

kerek

éles

**A combfej**

gömb alakú

bal jobb

sekély

ellaposodott    
életlen, felrakódásos

gomba alakú

szögletes

ellaposodott

**A fej helyzete a vápában**

mély

excentrikus

subluxált

luxált

**A combnyak**

szabályos,  
a fejtől jól elkülönül

kontúros

henger alakú

megrövidült

felrakódásos

**Az ízületi rés**

koncentrikus

divergáló

**A Norberg szög**

legalább 105°

kisebb, értéke:

A fentiek alapján a bizottság ..... besorolást adott.

MKOE ikt. sz.: .....

dátum: .....

### A kutya

fajtája: ..... neve: .....  
születési ideje: ..... ivara: .....  
színe: ..... tetoválási/chip száma: .....  
tulajdonos neve: ..... címe: .....

A röntgenképek értékelésekor az FCI (Federation Cynologic Internationale) által kibocsátott kritériumok az irányadóak. Ezek alapján:

- **Mentes:** a combcsontfej és az acetabulum kongruens, a Norberg szög  $105^\circ$ , vagy nagyobb, a cranialis acetabularis perem éles, kerek lefutású, az ízületi rés szűk és egyenletes tágasságú.
- **Átmeneti forma:** a combcsontfej és az acetabulum enyhén inkongruens, a Norberg szög  $105^\circ$ , vagy nagyobb, illetve kisebb  $105^\circ$ -nál, de az ízület kongruens.
- **Enyhe fokú:** a combcsontfej és az acetabulum inkongruens, a Norberg szög  $100^\circ$  vagy nagyobb, kissé ellaposodott a cranialis acetabularis perem, csak enyhe artrotikus jelek a cranialis acetabularis peremen, a dorsalis acetabularis peremen, a combcsontfejen, vagy a combnyakon.
- **Közepes fokú:** kifejezett inkongruencia, szubluxáció, a Norberg szög  $90^\circ$ , vagy nagyobb, a cranialis acetabularis perem ellaposodása, artrotikus jelek.
- **Súlyos fokú:** a combcsontfej szubluxált, luxált, a Norberg szög  $90^\circ$ -nál kisebb, a cranialis acetabularis perem ellaposodott, a combcsontfej deformált (ellaposodott, gomba alakú), artrotikus jelek.

### Megjegyzés

Tekintettel arra, hogy a Norberg szög meghatározását mind a felvételi beállításnál, mind a szög kiszervezésénél számos tényező befolyásolhatja, a bírálókat során helytelen önálló értékmérőnek venni, csak a többi paraméter együttes figyelembevételével szabad az értékelést elvégezni.